

## 4. gyakorlat

### Lineáris egyenletrendszerek

**F1.** Oldja meg az

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 + 2x_3 &= -1 \\2x_1 - x_2 + 2x_3 &= -4 \\4x_1 + x_2 + 4x_3 &= -2\end{aligned}$$

egyenletrendszert Gauss-eliminációval, majd az együtthatómátrix invertálásával is.

**F2.** Oldja meg a valós számok körében a

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 - x_3 - x_4 &= 2 \\9x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 - 2x_5 &= 5 \\x_1 - x_2 - x_4 + 2x_5 &= 1 \\x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + 4x_5 &= 2\end{aligned}$$

egyenletrendszert.

**F3.** A  $p$  és a  $q$  valós paraméter függvényében adja meg az

$$\mathbf{x}^T \cdot \mathbf{A} = \mathbf{b}^T$$

egyenletrendszer összes valós megoldását, ha

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & -2 \\ 1 & 2 & p \end{bmatrix} \quad \text{és} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2q \\ 4q \\ q \end{bmatrix}.$$